

ชมายสาร

ฉบับที่ 134/2569



ไวรัสฮันตา

ภัยพิบัติจาก 'หนู'



โรคติดเชื้อไวรัสฮันตา
(Hantavirus Disease)

เป็นโรคติดต่อจากกลุ่ม RNA ในตระกูล
Hantaviridae ซึ่งพบได้ในสัตว์ฟันแทะ
และสามารถติดต่อสู่คน
จนเป็นอันตรายถึงชีวิต

อาการหลัก 2 กลุ่ม


ระยะฟักตัว 1-8 สัปดาห์ แล้วแต่หนูมักเกิด
อาการภายใน 1-2 สัปดาห์

1 กลุ่มอาการทางไต (HFRS)

พบมาก : เอเชีย, ยุโรป

อาการ : ไข้สูง, ปวดศีรษะ

จุดเลือดออกใต้ผิวหนัง
อาจมีไตวายเฉียบพลัน



2 กลุ่มอาการทางปอด (HPS)

พบมาก : อเมริกา

อาการ : ไข้, ปวดกล้ามเนื้อรุนแรง
น้ำท่วมปอด หายใจลำบาก
(อันตรายถึงชีวิต)



การติดต่อ



สูดดมฝุ่นละออง

ที่มีปัสสาวะ อุจจาระ
หรือน้ำลายหนูที่แห้งแล้วฟุ้งกระจาย



สัมผัสสารคัดหลั่งหนู

แล้วขี้นตา จมูก ปาก



กินอาหาร ที่ปนเปื้อน

หรือถูกหนูที่มีเชื้อกัด (พบได้น้อย)

วิธีการป้องกัน



เก็บอาหาร
ให้มิดชิด

ใส่ภาชนะมีฝาปิด
ไม่วางอาหารทิ้งไว้



จัดบ้าน
ให้สะอาด

เก็บกวาดสม่ำเสมอ
ไม่ให้หนูอาศัยอยู่



ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ
ทำความสะอาด

ทำความสะอาดพื้นผิว
และจุดเสี่ยงเป็นประจำ



ห้ามกวาด
หรือดูดฝุ่นโดยตรง

ควรฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
หรือพรมน้ำก่อน