

ไวรัสฮันตา

ภัยพหะจากหนู'



โรคติดเชื้อไวรัสฮันตา (Hantavirus Disease)
เป็นโรคติดต่อจากกลุ่ม RNA ในตระกูล Hantaviridae
ซึ่งพบได้ในสัตว์ฟันแทะและสามารถติดต่อสู่มน
จนเป็นอันตรายถึงชีวิต


อาการหลัก 2 กลุ่ม

ระยะฟักตัว 1-8 สัปดาห์ แต่ส่วนใหญ่มักมีอาการภายใน 1-2 สัปดาห์

1 กลุ่มอาการทางไต (HFRS)

พบมาก : เอเชีย และยุโรป


อาการ : ไข้สูง ปวดศีรษะ
จุดเลือดออกใต้ผิวหนัง
และอาจมีไตวายเฉียบพลัน



2 กลุ่มอาการทางปอด (HPS)

พบมาก : อเมริกา

อาการ : ไข้ ปวดกล้ามเนื้อรุนแรง
น้ำท่วมปอด หายใจลำบาก
(อันตรายถึงชีวิต)



การติดต่อ



สูดดมฝุ่นละออง

ที่มีปัสสาวะ อุจจาระ
หรือน้ำลายหนูที่แห้งแล้วฟุ้งกระจาย



สัมผัสสารคัดหลั่งหนู

แล้วขยี้ตา จมูก ปาก



กินอาหาร ที่ปนเปื้อน

หรือถูกหนูที่มีเชื้อกัด (พบได้น้อย)

วิธีการป้องกัน



เก็บอาหาร
ให้มิดชิด



จัดบ้าน
ให้สะอาด

อย่าสัมผัส!! สารคัดหลั่งของหนู เช่น ฉี่หนู, น้ำลายหนู ด้วยมือเปล่า



- 1 สวมถุงมือ และหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
- 2 หลีกเลี่ยงการกวาดแห้งหรือดูดฝุ่น
ที่ทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย
- 3 พรมน้ำผสมผงซักฟอก หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ
ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที
- 4 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
น้ำยาซักผ้าขาว หรือน้ำผสมผงซักฟอกอีกครั้ง

